

## GESAPAX® 500 SC

syngenta



**Herbicida**  
Suspensión concentrada SC

**ACCIÓN FITOSANITARIA:** GESAPAX 500 SC es un herbicida selectivo del grupo de las triazinas. Combate la mayoría de las malas hierbas anuales monocotiledóneas y dicotiledóneas, así como algunas especies perennes en cultivos tropicales, tales como caña de azúcar, piña, café, banano, cítricos.

**NOMBRE COMÚN:** Ametrina.

**FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:** Suspensión concentrada que contiene 480 g de i.a. por litro de producto comercial.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Es un herbicida sistémico absorbido por las hojas y raíces de las malezas. Es translocado acropetalmente por el xilema hasta los ápices en donde se acumula y por medio de procesos enzimáticos inhibe la fotosíntesis hasta causar la muerte de las malezas.

**COMPATIBILIDAD:** Compatible con otros herbicidas, fungicidas e insecticidas de reacción neutra.

Antes de mezclar con otro producto se recomienda efectuar una prueba previa.

**TOXICIDAD:** Categoría Toxicológica III. (Franja azul). Ligeramente Peligroso.

DL<sub>50</sub> Oral: 912 mg/kg  
DL<sub>50</sub> Dermal: 10 200 mg/kg

**DOSIFICACIÓN:** Malezas que controla:

**Monocotiledóneas (Gramíneas):** Pata de gallina (*Eleusine indica*), arrocillo (*Echinochloa* sp), paja colorada (*Panicum* sp), pega-pega (*Cenchrus* sp).

**Dicotiledóneas (Hoja ancha):** Verdolaga (*Portulaca* sp), bledo (*Amaranthus* sp), batatilla (*Ipomoea* sp), achochilla (*Momordica* sp).

**MARGEN DE SEGURIDAD:** Aplicando AMETRINA 160 días entre la última aplicación y la cosecha no se encuentran residuos en los frutos.

**PRECAUCIONES:** No es irritante. No es inflamable ni explosivo. No mancha, no es corrosivo. No debe aplicarse si hay mucho viento ya que puede dañar cultivos vecinos al mojar las hojas o la parte aérea de éstos e incluso de la caña de azúcar.

**ADVERTENCIA:** En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**RECOMENDACIONES DE USO DE GESAPAX 500 SC:**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS l/ha	INTERVALO ULTIMA APLICACION
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
<b>CANA DE AZÚCAR</b> <i>Saccharum officinarum</i>	Bledo Amor seco Coquito Guardarocio Pata de gallina Pajas	<i>Amaranthus</i> spp <i>Bidens pilosa</i> <i>Cyperus</i> spp <i>Digitaria sanguinalis</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Leptochloa</i> spp	4 - 6	Después de la siembra y sobre malezas nacidas.  (5-10 cm de alto).
<b>PIÑA</b> <i>Ananas comosus</i>	Bledo Paja patillo Pata de gallina Betillas Achochilla Verdolaga	<i>Amaranthus</i> spp <i>Echinochloa colonum</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Ipomoea</i> spp <i>Momordica charantia</i> <i>Portulaca oleracea</i>	3 - 5	Después de la siembra y sobre malezas nacidas.  (5-10 cm de alto).
<b>BANANO</b> <i>Musa</i> sp	Bledo Guardarocio Pata de gallina Lechosa Betillas Pajas Achochilla Saboya	<i>Amaranthus</i> spp <i>Digitaria sanguinalis</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Euphorbia</i> spp <i>Ipomoea</i> spp <i>Leptochloa</i> spp <i>Momordica charantia</i> <i>Panicum maximum</i>	3 - 5	Postemergencia temprana de las malezas, 3 veces al año.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES:** No disponer con residuos municipales.

Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Mantenga el producto en sus envases originales en un lugar seguro, seco y fresco, FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

No transporte ni almacene con productos de uso humano o pecuario.

Evite almacenar a temperaturas por encima de 35° C.

**NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

En caso de intoxicación:

**Por inhalación:** Retire al paciente a un lugar fresco y ventilado.

**Por contacto:** Con la piel lavar con abundante agua; con los ojos manteniendo los párpados separados lave con abundante agua por lo menos 15 minutos.

**Por ingestión:** NO INDUZCA EL VÓMITO.

**ANTIDOTO:** No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN O DERRAMES LLAMAR A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS DE CISPROQUIM: 1800 59-3005 PARA QUITO, LA SIERRA, CENTRO Y NORTE, PARA EL RESTO DEL PAÍS (571) 288-6012. LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA.”

Para mayor información, llamar a ECUAQUÍMICA C.A. a los teléfonos (04) 268-2050 en Guayaquil o al (02) 286-1690 en Quito.

**PRESENTACIONES:**

Envase x 1 litro.

Caneca x 20 litros.

**REGISTRO MAGAP:** 015 - H 10 U.

**Fabricante:** SYNGENTA CROP PROTECTION S.A.

**Distribuido por:** ECUAQUÍMICA.