

Acatak®

INHIBIDOR DE CRECIMIENTO DE GARRAPATAS

COMPOSICIÓN

ACATAK® POUR-ON a base de Fluzurón al 2.5%, es un inhibidor del desarrollo de las garrapatas en bovinos.

INDICACIONES

ACATAK® POUR-ON está recomendado para el control estratégico de las garrapatas *Boophilus microplus*, incluyendo cepas resistentes a los acaricidas conocidos. Mediante su uso estratégico continuado controla poblaciones de garrapatas en los potreros y en el ganado llegando a ser necesario utilizar tan sólo 3 a 4 aplicaciones/año, según el grado de incidencia y el tipo de explotación.

ACATAK® POUR-ON interrumpe el ciclo de vida de las garrapatas en sus diferentes estadios al interferir en la formación de quitina, sustancia que conforma la cutícula; larvas y ninfas presentes sobre el ganado y que ingieran su sangre, no completarán la muda para los estadios siguientes y morirán. Las hembras adultas que sobre el ganado tomen sangre, transferirán Fluzurón a sus ovarios y de ahí a sus huevos; éstos no eclosionarán. De esta manera, con el uso de ACATAK® POUR-ON se aseguran potreros y animales limpios.

APLICACIÓN

ACATAK® POUR-ON se aplica a dosis de 2.5 mg por kg de peso corporal, es decir, 5 mL por 50 kg de peso. Es absorbido a través de la piel principalmente, y por vía oral cuando los animales se lamen, estableciéndose en el torrente sanguíneo un equilibrio de entrega mutua o doble vía entre éste y el tejido graso. Así se mantiene



la concentración en la sangre por un tiempo prolongado (4 a 6 semanas).

ACATAK® POUR-ON se aplica esparciendo el producto listo para su uso, en dos franjas paralelas, a lado y lado de la línea media dorsal, desde la cruz hasta la base de la cola con el aplicador ACATAK® POUR-ON o con el envase dispensador de litro.

Por conducta **NO** aplique ACATAK® POUR-ON a ganado en lactación cuya leche sea destinada al consumo humano. La dosis recomendada es de 5 mL por 50 kg de peso vivo:

| Peso (kg) | Volumen (mL) | Peso (kg) | Volumen (mL) |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 51 a 100 | 10 | 101 a 150 | 15 |
| 151 a 200 | 20 | 201 a 250 | 25 |
| 251 a 300 | 30 | 301 a 350 | 35 |
| 351 a 400 | 40 | 401 a 450 | 45 |
| 451 a 500 | 50 | 501 a 550 | 55 |
| 551 a 600 | 60 | 601 a 650 | 65 |

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 42 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIÓN

Garrafa por 1 y 5 lts. Aplicador.

Clasificación Toxicológica III (Medianamente Tóxico)

- Reg. ICA No. 4.034-DB • Reg. Ecuador 3B2-4857-SESA-U
- Reg. Perú 233261096-I • Reg. Venezuela P.I 6.545

• Manténgase fuera del alcance de los niños • Consulte al Médico Veterinario