

Bayticol® EC 6%

Flumetrina
Garrapaticida
Solución uso externo

REGISTRO: 3 B1-2060-AGROCALIDAD

DESCRIPCIÓN:

Garrapaticida piretroide sintético para el control de toda clase de garrapatas, incluyendo cepas resistentes a organofosforados.

USO:

Bovinos

PROPIEDADES:

Bayticol® desarrolla un triple efecto mortal contra las garrapatas.
Efecto esterilizador. Bayticol® inhibe totalmente el desove de las garrapatas.
Efecto residual. Bayticol® evita una pronta reinfestación.
Efecto destructor. Bayticol® elimina todos los estadios de las garrapatas en todas las áreas del animal.

COMPOSICIÓN:

Flumetrina al 6%

INDICACIONES:

Bayticol® está indicado para ser utilizado en todos los sistemas de baño; bañaderas de aspersión, inmersión y bombas fumigadoras. Inicialmente debe prepararse una emulsión efectuando la premezcla (ver Asuntol® líquido)

ADMINISTRACIÓN/DOSIS:

Garrapatas: dilución 1:2.000 (1 L de Bayticol® x 2.000 L de agua).
En bañaderas de inmersión no hay arrastre la recarga es igual a la carga inicial (500 ml de Bayticol® x 1.000 L gastados).
Para un buen programa de control de garrapatas, recomendamos al iniciar el plan utilizar los intervalos de aplicaciones usuales en la zona.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.
No posee antídoto específico, se debe realizar tratamiento sintomático.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 48 horas después de finalizado el tratamiento. No tiene tiempo de retiro en leche, para evitar el riesgo de contaminación de la leche, aplicar el producto estrictamente después del ordeño.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

Mantener en un lugar seco y fresco

Elaborado en Bayer S.A. Colombia
Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com

PRESENTACIÓN:

- Frasco x 20, 100 y 500 ml