

Curagan[®]NL

LARVICIDA ANTISÉPTICO AEROSOL TÓPICO

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contienen:

Cipermetrina High Cis	1.25 g
Piperonil butóxido	1 g
Violeta de metilo	0.5 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

DESCRIPCIÓN

Larvicida, antiséptico con base en cipermetrina y violeta de metilo con propelente que no daña la capa de ozono.

INDICACIONES

Larvicida y antiséptico para gusaneras (miasis) y heridas, afecciones locales en general como son las lesiones podales y de los pezones, úlceras, abscesos, escoriaciones de la piel y heridas en general.

USOS

- Por su acción larvicida, ayuda a la desinfección y cicatrización de las heridas y controla de manera eficaz las gusaneras o miasis.
- Asepsias en cirugías: castraciones, cesáreas, cortes de cola.
- Heridas, infecciones microbianas, de pezuñas, pezones, onfaloflebitis.
- Infecciones bacterianas secundarias en lesiones de fiebre aftosa y estomatitis vesicular, sabañon, pododermatitis.
- Escoriaciones y úlceras de la piel, mataduras.
- Uso en bovinos, equinos, porcinos, caninos, caprinos y ovinos.



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Dirija la válvula hacia el sitio afectado, a unos 20 cm de distancia y presiónela rociando el producto hasta cubrir totalmente el área de piel o mucosa afectada.

PRECAUCIONES

No almacenar este producto junto con alimentos. Evitar el contacto con los ojos. No perforar ni arrojar al fuego el envase vacío. Manténgase en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

Envase metálico, aerosol por 375 mL.

Clasificación Toxicológica III (Medianamente Tóxico)

• Reg. ICA No. 6.372-MV

• Manténgase fuera del alcance de los niños • Consulte al Médico Veterinario