

DICLAMAX

Descripción del producto

Composición

Diclazuril.....5 g
Excipientes c.s.p.....1 000 g

Indicaciones

DICLAMAX[®], está recomendado la prevención de coccidiosis en:

- Pollos de Carne: Coccidiosis causadas por Eimeria acervulina, Eimeria tenella, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eimeria necatrix y Eimeria mivati.
- Pavos: Coccidiosis causadas por Eimeria adenoeides, Eimeria dispersa, Eimeria gallopavonis, Eimeria meleagrimitis y Eimeria meleagridis.

Administración y Dosis

Pollos de Carne: Mezclar bien 200 g de Diclamax por tonelada de alimento (1,0 ppm), durante todo el periodo de vida del ave.

Pavos: Mezclar bien 100 a 200 g de Diclamax por tonelada de alimento(0,5 a 1,0 ppm), durante todo el periodo de vida del ave.

Periodo de Retiro

El uso de DICLAMAX[®] debe suspenderse 5 días antes del beneficio de las aves.

Registro SENASA N° F.08.20.N.0422
INNOVA ANDINA S.A.

Información comercial

Presentación

DICLAMAX[®], se comercializa en bolsa de papel trilaminado con plástico interior de 25 kg