

FLORAFEN 20

Descripción del producto

Antibiótico

COMPOSICIÓN

Florfenicol 20 %
 Bromhexina 0.5 %
 Excipientes c.s.p. ... 100 %

El Florfenicol es un antibiótico análogo del Tiamphenicol el cuál es un derivado del Cloranfenicol que teniendo la misma actividad antibacteriana no produce anemia aplásica. Difiere del Cloranfenicol en la sustitución del grupo metil sulfonilo y la incorporación de un átomo de flúor que aumenta su actividad antibacteriana. Su absorción y distribución son similares a aquellos del cloranfenicol.



La Bromhexina se comporta como un mucolítico y expectorante por activación de las glándulas seromucosas.

INDICACIONES

Florafen 20 está indicado para el tratamiento y control de infecciones producidas por microorganismos sensibles al Cloranfenicol, actúa contra un amplio espectro de bacterias Gram positivas y Gram negativas como: *Corynebacterium pyogenes*, *Bacillus anthracis*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Salmonella sp.*, *Listeria monocytogenes*, *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Clostridium sp.*, *Escherichia coli*, *Pasteurella hemolitica*, *Pasteurella multocida*, *Avibacterium sp.* (antes *Haemophilus sp*) *Mycoplasma sp.*, *Actinobacillus sp.*, entre otros.

Favorece la liquefacción y expectoración de secreciones en procesos bronquiales.

MECANISMO DE ACCIÓN

EL Florfenicol produce el bloqueo de la síntesis proteica al ligarse a la porción 50 S del ribosoma inhibiendo la actividad de la peptidil transferasa lo que produce la muerte bacteriana.

Bromhexina. Ejerce cierta acción estimulante de la secreción de las glándulas mucosas bronquiales. *In vitro* ejerce acción mucolítica por despolimerización de las sialomucinas con reducción de la viscosidad. Libera a la luz bronquial enzimas hidrolíticas de origen lisosómico y altera en consecuencia la trama fibrilar de los mucopolisacáridos ácidos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

- Para uso en agua de bebida o vía alimento: 100 mg de FLORAFEN 20 por cada 1 kg p.v.
- Mantener el tratamiento por 5 días en el agua de bebida y 7 días vía alimento.

ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase original bien cerrado en un lugar seco y protegido de la luz solar directa y el calor
- Una vez abierto el producto consumir toda la bolsa o de lo contrario volver a sellar herméticamente
- Una vez realizada la dilución en el agua de bebida, ésta debe consumirse totalmente.

PERIODO DE RETIRO

Aves de engorde: 5 días.

Cerdo: 8 días.

PRECAUCIONES

- No usar en ponedoras en producción de huevos para consumo humano ni en vacas lecheras en producción
- Mantener lejos del alcance de los niños

Uso Veterinario

Registro SENASA F.03.26.N.0961
INNOVA ANDINA S.A.

Información comercial

PRESENTACIÓN

Florafen 20, se comercializa en bolsa de aluminio de 1 Kg