

IVOMEK INYECTABLE®

Para el tratamiento y control de parásitos internos y externos en bovinos y cerdos Inyectable

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ivermectina, Merial 1 g
Vehículo c.s.p. 100 ml

INDICACIONES PARA BOVINOS:

IVOMEK Inyectable es altamente efectivo para el tratamiento y control de los siguientes parásitos internos: nemátodos gastrointestinales (incluyendo las formas inhibidas de *Ostertagia ostertagi*); parásito pulmonar: (*Dictyocaulus viviparus*); *Parafilaria bovicola*; *Thelazia* spp. y de los siguientes parásitos externos: tupe (*Dermatobia hominis*); gusaneras (*Cochliomyia hominivorax*); piojos (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Damalinea bovis*); ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Psoroptes communis* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*) y de la garrapata *Boophilus microplus* (eficacia máxima se obtiene 4-5 días después del tratamiento).

Actividad persistente: IVOMEK inyectable aplicado a la dosis recomendada en bovinos controla eficazmente las infestaciones de los siguientes parásitos durante los períodos mencionados a continuación: *Haemonchus placei* y *Cooperia* spp. durante 14 días; *Ostertagia ostertagi* y *Oesophagostomum radiatum* durante 21 días y *Dictyocaulus viviparus* durante 28 días.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Por inyección subcutánea únicamente. Aplicar 1 ml de producto por cada 50 kg de peso vivo, equivalente a 200 mcg de ivermectina Merial, por kg de peso vivo.

INDICACIONES PARA CERDOS: IVOMEK Inyectable es altamente efectivo para el tratamiento y control de los siguientes parásitos internos: nemátodos gastrointestinales (*Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides ransomi*, administrado a las cerdas 7-14 días antes del parto también controla efectivamente la transmisión de este parásito a los lechones a través de la leche, y *Trichuris suis*), parásito pulmonar (*Metastrongylus* spp.), parásito del riñón (*Stephanurus dentatus*) y de los siguientes parásitos externos: piojos (*Haematopinus suis*) y ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei* var. *suis*).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Por inyección subcutánea únicamente. Aplicar 1 ml de producto por cada 33 kg de peso vivo, equivalente a 300 mcg de ivermectina Merial por kg de peso.





SEGURIDAD EN BOVINOS Y CERDOS: Estudios realizados en animales de todas las edades, hembras en los diversos estados de gestación y reproductores, han demostrado un amplio margen de seguridad cuando es administrado a la dosis recomendada de uso.

PRESENTACIONES:

Envase x 50 ml.
Envase x 200 ml.
Envase x 500 ml.

REGISTRO SANITARIO: 3A1-1788-SESA-U
Elaborado por: Merial
Importado y Distribuido por: ECUAQUÍMICA.