

PARASITOS EXTERNOS:

- GARRAPATAS. *Boophilus microplus*.
- NUCHE: *Dermatobia hominis*.
- PIOJOS: *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus*, *Haematopinus eurysternus*, *Damalinia bovis* (coadyudante en su control).
- ACAROS DE LA SARNA: *Psoroptes communis* var. *bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*.

PORCINOS

PARASITOS INTERNOS:

- Parásitos gastrointestinales: *Ascaris suum* (adulto y cuarto estado larvario), *Hyostrongylus rubidus* (adulto y cuarto estado larvario), *Oesophagostomum* sp (adulto y cuarto estado larvario). Coadyudante en el control de *Strongyloides ransomi* (adultos) y *Trichuris suis* (adultos). Ivermax[®] aplicado en cerdas preñadas 7 a 14 días antes del parto, controla la transmisión por la leche de *S. ransomi* a los lechones.
- Nemátodo pulmonar: *Metastrongylus* sp (adultos).
- Parásito del riñón: *Stephanurus dentatus*.

PARASITOS EXTERNOS:

- PIOJOS: *Haematopinus suis*.
- ACAROS DE LA SARNA: *Sarcoptes scabiei* var. *suis*.

DOSIFICACION Y ADMINISTRACION

BOVINOS:

Ivermax[®] inyectable se aplica solamente por vía subcutánea.

Dosis Básica: 200 mcg por kg de peso.

En la práctica: 1 mL de Ivermax[®] por cada 50 kg de peso vivo.

Las jeringas y agujas utilizadas deben estar esterilizadas y usar asepsia en la aplicación.

TABLA DE DOSIFICACION BOVINOS

Peso Animal	Ivermax [®]	Peso Animal	Ivermax [®]
kg	mL	kg	mL
Hasta 50	1	301 – 350	7
51 – 100	2	351 – 400	8
101 – 150	3	401 – 450	9
151 – 200	4	451 – 500	10
201 – 250	5	501 – 550	11
251 – 300	6	551 – 600	12

PORCINOS:

Ivermax[®] se aplica solamente por vía subcutánea.

Dosis Básica: 300 mcg por kg de peso.

En la práctica: 1 mL de Ivermax[®] por cada 33 kg de peso vivo.

TABLA DE DOSIFICACIÓN PORCINOS

Peso Animal	Ivermax [®]	Peso Animal	Ivermax [®]
kg	mL	kg	mL
Hasta 8	0.25	67 – 99	3
9 – 16	0.50	100 – 132	4
17 – 33	1.00	133 – 165	5
34 – 50	1.50	166 – 198	6
51 – 66	2.00	199 – 232	7

RECOMENDACIONES EN CERDOS:

1. REPRODUCTORES:

Cerdas Jóvenes: Tratarlas 7 –14 días antes de la monta.

Cerdas preñadas: Tratarlas 7 – 14 días antes del parto.

Cerdos: Tratarlos mínimo cada 4 meses.

NOTA: Al iniciar un programa de control parasitario deben tratarse todos los animales.

2. ENGORDE:

Deben tratarse antes de entrar a los locales de ceba. Si son de piso de tierra puede hacerse un segundo tratamiento.

En ácaros de la sarna, el Ivermax[®] actúa suficientemente para controlar infestaciones desde el huevo hasta el adulto. No exponer los animales tratados a cerdos no tratados o locales infestados hasta una semana después del tratamiento.

En piojos el Ivermax[®] no afecta sus huevos por lo tanto se requiere una nueva aplicación.

SEGURIDAD: Estudios de campo en bovinos y porcinos gestantes y no gestantes han mostrado un amplio margen de seguridad de la ivermectina cuando se administra a las dosis recomendadas.

PRECAUCIONES:

- No aplicarlo por vía intravenosa ni intramuscular.
- Protéjase de la luz manteniéndolo en su caja.

TIEMPO DE RETIRO:

-Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días en bovinos y 28 días en porcinos después de finalizado el tratamiento.

-No aplicarlo en vacas en producción de leche destinada al consumo humano.

-No aplicarlo 28 días antes del parto.

PRESENTACION:

Frasco por 20, 50, 250, 500 mL.

Destruya el envase en forma segura. (Incinere o destruya).

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSERVESE EN LUGAR FRESCO, SECO Y PROTEGIDO DE LA LUZ. CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Registro ICA No. 3850-DB

Costa Rica Reg. No. M.A.G. CO5-42-05-1895

Ecuador Reg. No. 3AB-5967-SESA-U

Guatemala Reg. No. 22-29-12-8167

Panamá Reg. No. RF-4597

Perú Reg. No. F.09.1.059.I

Rep.Dom. Reg. No. 3624-2000

Venezuela Reg. No. M.I. 8.014

Presentacion: frasco por 20, 50, 250 Y 500 mL.

COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A.

Calle 15 No. 40-11, Tel. 3 681768

Bogotá, D.C. – Colombia