

Kuramicina L.A.

**Acción sostenida. Biodisponible por 5 días.
Un solo tratamiento basta.**

Descripción:

Antibiótico inyectable de acción inmediata y prolongada.

Fórmula:

Cada 100 ml contiene: oxitetraciclina base anfotérica, 20 g, excipientes y vehículo c.s.

Indicaciones:

Preventivo y curativo de los procesos infecciosos en general, causados por bacterias Gram positivas y Gram negativas, micoplasmas, rickettsias y clamidias en bovinos, ovinos y porcinos. Muy efectivo en queratoconjuntivitis (intrapalpebral) y tratamiento de Campylobacteriosis en toros.

Administración y dosis:

Aplicar 1 ml cada 10 kg de peso por vía IM exclusivamente. En lechones de menos de 10 kg, aplicar 1 ml total por vía IM o SC. Tanto para los tratamientos preventivos como curativos, la frecuencia es de una sola aplicación, salvo que la afección sea lo suficientemente grave como para ameritar una segunda aplicación a los 3 a 5 días.

Precauciones:

Según el volumen total a administrar, la aplicación debe realizarse en dos o más puntos de inyección no superando en ningún caso los siguientes volúmenes en cada punto: 20 ml en bovinos, 5 ml en ovinos y 10 ml en porcinos.

Presentación

Frasco ampolla conteniendo 40, 100 y 250 ml.

