

Masticilina® Lactación

Cloxacilina + Ampicilina

Asociación antibiótica

Antimastítico intramamario

Suspensión intramamaria

REGISTRO: 2C-2-511-6-AGROCALIDAD

DESCRIPCIÓN:

Suspensión intramamaria para el tratamiento de mastitis de vacas en periodo de lactancia.

PROPIEDADES:

La Masticilina® Lactación presenta acción bactericida contra los gérmenes causantes de la mayoría de las mastitis.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Ambos antibióticos inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana por inhibición de las enzimas transpeptidasas y carboxipeptidasas, provocando un desequilibrio osmótico que destruye a las bacterias.

Farmacocinética: tras la administración de una dosis, los niveles máximos obtenidos a las 24 horas en la secreción mamaria son de 84,55 mg/ml de ampicilina (sódica) y de 125,01 mg/ml de cloxacilina (sódica). Los niveles terapéuticamente eficaces de antibiótico se mantienen al menos durante 12 horas después del tratamiento.

USO:

Bovinos

COMPOSICIÓN:

Cada jeringa x 5 ml contiene:

Cloxacilina sódica 200 mg

Ampicilina sódica 75 mg

Excipientes c.s.p. 1 jeringa

INDICACIONES:

Masticilina® Lactación está indicada para el tratamiento de la mastitis clínica de vacas durante el periodo de lactancia causada por: *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium pyógenes*, *Escherichia coli*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN/DOSIS:

Antes de la aplicación del producto se deben limpiar y desinfectar los pezones, e infundir el contenido de la jeringa a través del conducto del pezón en cada cuarto afectado.

Se recomienda aplicar un masaje ascendente para una mejor distribución de la Masticilina® Lactación

Aplicar después del ordeño, cada 12 horas x 3 ordeños consecutivos.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:

No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos.

No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas o alergia a las cefalosporinas.

TIEMPO DE RETIRO:

La leche producida durante el tratamiento y 60 horas después de finalizar el mismo no debe darse para consumo humano.

Animales tratados no se deben sacrificar para consumo humano, hasta 7 días después de finalizado el tratamiento.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

Mantener en un lugar seco y fresco

Elaborado por Norbrook Lab. Irlanda del Norte



Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com

PRESENTACIÓN:

- Caja x 24 jeringas x 5 ml cada una.