

COMPOSICIÓN

Cada 1 000 gramos contiene:

Robenidina.....	66 g
Excipientes c.s.p.....	1 000 g

La **Robenidina** es un químico derivado de la Guanidina siendo un compuesto altamente eficaz contra las principales especies de *Eimeria* que infectan a los pollos.

INDICACIONES

ROBIMAX está indicado para la prevención de la coccidiosis en pollos de carne causadas por: *Eimeria tenella*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria mivati*, *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima* y *Eimeria mitis*.

MECANISMO DE ACCIÓN

La **Robenidina** actúa mediante una doble acción: coccidicida y coccidiostático. Efectúa su acción sobre las diferentes etapas del desarrollo del esquizonte y merozoitos de primera generación, posteriormente inhibe el desarrollo de la segunda generación de esquizontes pudiendo llegar a tener un efecto sobre la gametogonia. Actúa inhibiendo la fosforilación oxidativa de las coccidias.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en el alimento.

ROBIMAX se dosifica a razón de 500 g por tonelada de alimento concentrado (33 ppm) por todo el período de vida del ave.

Mezclar previamente la dosis indicada con 10 kg de sub-producto y agréguese al proceso de mezclado del alimento.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 5 días

PRECAUCIONES

- Mantener lejos del alcance de los niños y los animales domésticos.
- Utilizado de acuerdo a las indicaciones es un producto muy seguro.

ALMACENAMIENTO

Mantener el envase original bien cerrado, a resguardo de temperaturas extremas, en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

ROBIMAX, se comercializa en bolsas de papel trilaminado de 25 kg

Producido por: **INNOVA ANDINA S.A.**

Distribuido por: **INNOVA ANDINA S.A.**

USO VETERINARIO