

Singestar Comprimidos

**Controla el celo y la pseudopreñez a mínima dosis.
Dermatología felina.**

Descripción:

Progestágeno anticonceptivo y de uso dermatológico para caninos y felinos.

Fórmula:

Cada comprimido contiene:
acetato de megestrol 20 mg,
excipientes c.s.p. 280 mg.

Indicaciones:

En perras y gatas: prevención o anulación del celo, tratamiento de tumores estrógeno dependientes. En perros: tratamiento de la hipersexualidad, adenoma de glándulas perianales e hipertrofia de próstata. En gatos: tratamiento de la hipersexualidad, de la dermatitis miliar y del granuloma eosinofílico.



Administración y dosis:

Perras: para prevenir o anular el celo administrar un comprimido cada 10 kg de peso por día durante 8 días (régimen normal) o un comprimido cada 10 kg de peso por día durante 4 días y 1/4 de comprimido cada 10 kg de peso por día durante 16 días (régimen extendido). Para retardar o postergar el celo administrar 1/4 de comprimido cada 10 kg de peso por día durante 30 a 40 días (régimen normal) o 1/4 de comprimido cada 10 kg de peso por día durante 30 a 40 días, continuando luego con 1/4 de comprimido cada 10 kg de peso 2 veces a la semana durante un período no mayor de 4 meses (régimen extendido). En tumores estrógeno dependientes administrar un comprimido cada 10 kg de peso por día durante 5 días continuando con 1/2 comprimido cada 10 kg de peso por día durante 10 días o más.

Gatas: para prevenir o anular el celo administrar 1/2 comprimido por día durante 7 días continuando con 1/4 de comprimido 1 ó 2 veces por semana. Para retardar o postergar el celo administrar 1/4 de comprimido durante un período no mayor de 2 meses o 1/4 de comprimido una vez por semana durante un período no mayor de 18 meses.

Perros: en hipersexualidad: 1 ó 2 comprimidos cada 10 kg de peso durante 14 días (dosis inicial), en algunos casos se suministrará una dosis de mantenimiento de 1/2 comprimido cada 10 kg de peso 1 ó 2 veces por semana. En adenoma de las glándulas perianales administrar un comprimido cada 10 kg de peso por día durante 20 días o más. En hipertrofia de próstata administrar un comprimido cada 10 kg por día continuando con 1/2 comprimido cada 10 kg de peso 2 veces a la semana.

Gatos: en hipersexualidad,

1/2 comprimido por día durante 7 días continuando con 1/4 de comprimido diario durante 14 días. Puede indicarse una dosis de mantenimiento de 1/4 de comprimido 1 ó 2 veces por semana. Dermatitis miliar: 1/2 comprimido por día durante 7 días continuando con 1/4 de comprimido 2 veces por semana hasta la curación total.



Granuloma eosinofílico: 1/2 comprimido día por medio hasta el inicio de la regresión continuando con 1/2 comprimido una vez por semana hasta la regresión total.

Presentación

Estuche conteniendo 8 comprimidos.

