

# CAPSTAR®

## EL ALIVIO INMEDIATO CONTRA LAS PULGAS EN PERROS Y GATOS SIN RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

### COMPOSICIÓN

Tabletas de 11.4 mg.  
Cada 100 mg contienen: CAPSTAR® 11.4 mg. de nitenpyram, excipientes precompreso.  
Tabletas de 57.0 mg.  
Cada 500 mg contienen: CAPSTAR® 57.0 mg. de nitenpyram, excipientes precompreso.

### DESCRIPCIÓN

Tabletas de administración oral para el tratamiento de las pulgas adultas en perros y gatos. Es un adulticida a base de Nitenpyram que actúa en el sistema nervioso de la pulga sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina, ocasionando parálisis y posteriormente la muerte del parásito. Las pulgas comenzarán a caer a partir de los 15 a 30 minutos después de su administración y no podrán reincorporarse en el animal. En algunos perros y gatos se observará un prurito pasajero, el cuál es causado por el movimiento errático de las pulgas durante su proceso de muerte, ésto indica que el producto está actuando. Al cabo de 6 horas el 100% de las pulgas habrá muerto y el medicamento permanecerá activo en el perro durante 24 horas y en el gato hasta 48 horas. La administración no exige cuidados especiales, no irrita la piel, los ojos, ni las vías respiratorias de los pacientes, ni los propietarios. El producto no se pierde con el baño.

### INDICACIONES

Infestaciones por pulga de los perros y los gatos *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* y *Pulex irritans*. Para el tratamiento y control de la dermatitis alérgica por pulgas.



### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Dosificación: Para efectos prácticos se suministra:  
1 tableta de 11 mg para perros y gatos de 1 a 11 kilos de peso.  
1 tableta de 57 mg para perros entre 11 y 57 kilos.  
2 tabletas de 57 mg para perros mayores de 57 kilos.  
La dosis mínima efectiva es de 1 mg/kg de peso vivo. CAPSTAR® tabletas puede administrarse con o sin las comidas.

### FRECUENCIA

Administrar la dosis cuando se observen nuevamente las pulgas sobre la mascota.

### SEGURIDAD

No tiene efectos colaterales ni contraindicaciones. Puede administrarse a perras y gatas durante la gestación y lactación. Se recomienda su uso a partir de las 4 semanas de edad y en animales con más de 1 kg de peso. No deja residuos tóxicos sobre el animal ni el medio ambiente. Puede asociarse con otras terapias o vacunas.

### PRESENTACIÓN

Sobre por 3 tabletas de 11.4 mg.  
Sobre por 3 tabletas de 57 mg.

• Reg. ICA No.5.483-DB • Reg. Ecuador 11.4 mg: 1B2-7481-SESA-U, 57 mg: 3B2-7552-SESA-U  
• Reg. Perú 11.4 mg: F.07.4.148.I, 57 mg: F.07.4.147.I • Reg. Venezuela 11.4 mg: M.I 9.854, 57 mg: M.I 9.855

• Manténgase fuera del alcance de los niños • Consulte al Médico Veterinario